

l'intègre

1^{RE}

MATHS

SPÉCIALITÉ

Cahier de calcul

Conçu par un collectif
de professeurs de lycée
et classe prépa,
sous la direction
de Colas Bardavid

DUNOD

Direction et conception graphiques de la couverture :
Nicolas Wiel - Pierre-André Gualino (graphiste)

Retrouvez nos ouvrages pour les prépas scientifiques ici



<http://dunod.link/prepassc>

NOUS NOUS ENGAGEONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT :



Nos livres sont imprimés sur des papiers certifiés pour réduire notre impact sur l'environnement.



Le format de nos ouvrages est pensé afin d'optimiser l'utilisation du papier.



Depuis plus de 30 ans, nous imprimons 70% de nos livres en France et 25% en Europe et nous mettons tout en œuvre pour augmenter cet engagement auprès des imprimeurs français.



Nous limitons l'utilisation du plastique sur nos ouvrages (film sur les couvertures et les livres).

Ce cahier de calcul a été écrit collectivement par une équipe composée de professeurs en classes préparatoires et de professeurs en lycée.

Conception et coordination

Colas BARDAVID

Aide à la coordination

Jérôme TROCHON

Équipe des auteurs

Romain BASSON

Ménard BOURGADE

Van Bien BUI

Carole CHABANIER

Geneviève DAVION

Hélène GROS

Benjamin GROUX

Nicolas LAILLET

Blaise LE MEAUX

Lionel MAGNIS

Quang-Thai NGO

Anthony OLLIVIER

Alan PELLÉ

Nicolas POPOFF

Relecture

Rémy ALLOU, Mélissa BAILLEUIL-INGLART, Anne-Lucie DELVALLEZ, Pierre CAUCHOIS, Jérôme GÄRTNER, Éliane GAYOUT, William GREGORY, Jonathan HARTER, Landry LAVOINE, Arthur MEYER, Pedro MONTOYA, Inès NEBZRY, Sébastien PELLERIN

Illustrations

Le pictogramme de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project).

Le pictogramme de la roue crantée a été créé par AFY STUDIO (The Noun Project).

Le pictogramme de la calculatrice a été créé par Sita RAISITA (The Noun Project).

Le pictogramme du bateau a été créé par MELLO (The Noun Project).

Sommaire

<i>Introduction</i>	vii
<i>Conventions suivies dans ce livre</i>	ix

Polynômes du second degré

<input type="checkbox"/> Fiche 1. Forme canonique	3
<input type="checkbox"/> Fiche 2. Discriminant et racines I	9
<input type="checkbox"/> Fiche 3. Discriminant et racines II	13

Polynômes

<input type="checkbox"/> Fiche 4. Polynômes I	18
<input type="checkbox"/> Fiche 5. Polynômes II	23

Dérivation

<input type="checkbox"/> Fiche 6. Dérivation I	28
<input type="checkbox"/> Fiche 7. Dérivation II	33
<input type="checkbox"/> Fiche 8. Dérivation III	40

Fonction exponentielle

<input type="checkbox"/> Fiche 9. Généralités sur l'exponentielle I	46
<input type="checkbox"/> Fiche 10. Généralités sur l'exponentielle II	51
<input type="checkbox"/> Fiche 11. Dérivation et exponentielle I	55
<input type="checkbox"/> Fiche 12. Dérivation et exponentielle II	61

Suites

<input type="checkbox"/> Fiche 13. Généralités sur les suites	66
<input type="checkbox"/> Fiche 14. Suites arithmétiques	70
<input type="checkbox"/> Fiche 15. Suites géométriques	74
<input type="checkbox"/> Fiche 16. Calcul de sommes I	78
<input type="checkbox"/> Fiche 17. Calcul de sommes II	83
<input type="checkbox"/> Fiche 18. Calcul de produits	89

Probabilités

- Fiche 19. Probabilités 93

Géométrie et vecteurs

- Fiche 20. Droites du plan.....100
- Fiche 21. Généralités sur les vecteurs 106
- Fiche 22. Coordonnées des vecteurs.....114

Trigonométrie

- Fiche 23. Fonctions trigonométriques I.....122
- Fiche 24. Fonctions trigonométriques II.....126


Produit scalaire

- Fiche 25. Produit scalaire I.....132
- Fiche 26. Produit scalaire II.....136

Logique et théorie des ensembles

- Fiche 27. Logique 144
- Fiche 28. Théorie des ensembles 149

Dans tout ce livre, l'usage de la calculatrice est strictement et formellement interdit.



Utiliser une calculatrice pour les exercices serait tout simplement absurde : le but même de ce livre est de fournir à l'étudiant un outil pour s'entraîner au calcul.

Introduction

Le calcul

Le calcul a parfois été délaissé par l'école.

On lui reprochait son côté rébarbatif, on disait que les calculatrices pouvaient s'en charger.

On lui préférait les activités de recherche, plus ludiques, plus intéressantes.

On déconseillait de donner aux élèves des fiches de calcul.

Ce faisant, on a formé des élèves à qui il manquait quelque chose d'essentiel.

Les vertus du calcul

Le calcul a de nombreuses qualités, de nombreuses vertus.

- Le calcul est indispensable aux mathématiques.

Sans calcul, les mathématiques seraient un paysage inerte, sans mouvement.

C'est le calcul qui permet de transformer une expression $A(x)$ en une autre expression $B(x)$.

C'est le calcul qui permet de montrer que deux quantités sont égales, que deux choses sont identiques.

Quand on explore une situation mathématique, l'intuition est la boussole, c'est elle qui nous indique la direction à prendre. Mais c'est le calcul qui permet d'avancer, de passer d'une étape à la suivante.

- Le calcul permet de se familiariser avec les objets mathématiques compliqués.

Certains objets mathématiques sont difficiles à appréhender. Qu'on pense par exemple aux vecteurs. On peut être dérouter la première fois qu'on doit raisonner avec les vecteurs. Dans ce cas, il est conseillé de beaucoup calculer avec les vecteurs. À force d'en faire, on s'y habitue ; à la fin, on n'est plus dérouter.

- Le calcul donne des idées.

Face à un problème mathématique, être fort en calcul est très utile. On imagine rapidement ce qui va se passer, on peut prévoir « de tête » la direction globale du calcul et donc prendre une bonne direction.

- Le calcul est comme un échauffement mathématique.

- Le calcul est *a priori* une activité sans piège.

Il suffit de suivre les règles méthodiquement.

- Le calcul peut même être ludique !

L'intérêt du calcul

C'est très simple.

Si vous voulez bien comprendre les mathématiques, le calcul est indispensable.

Quand on apprend à jouer au piano, faire des gammes est, de même, indispensable. Elles permettent de délier les doigts, elles permettent d'ancrer dans les mains des habitudes, des réflexes. Sans gamme, certains morceaux sont inabordables.

De même, la pratique du calcul permet de mieux comprendre les mathématiques.

Le cahier de calcul

Le cahier de calcul est l'outil idéal pour vous entraîner au calcul, en toute autonomie.

Il a été conçu par une large équipe de professeurs de mathématiques, en lycée et en classes préparatoires, tous soucieux de vous apporter l'aide et les outils pour réussir.

Comment est-il organisé ?




Trois parties pour chaque fiche

Chaque fiche du cahier de calcul est divisée en trois parties :

- une première partie de calculs généraux, destinée à **vous entraîner sur les fondamentaux** ;
- la partie principale, qui porte sur le thème de **la fiche en question** ;
- une dernière partie, composée de **calculs plus avancés**, qui est prévue pour ceux qui veulent aller plus loin.

Des pictogrammes

Le temps de résolution de chaque calcul (incluant la longueur et la technicité du calcul) est symbolisé par :

- des bateaux  pour les exercices de calculs généraux ;
- des horloges  pour les exercices de la partie principale ;
- des roues crantées  pour les exercices plus avancés.

Des cadres pour les réponses

Vous êtes invité à écrire directement les réponses dans les cadres prévus à cet effet.

Une erreur ? Une remarque ?

Si jamais vous voyez une erreur d'énoncé ou de corrigé, ou bien si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse cahierdecacul@gmail.com. Merci en nous contactant de donner l'identifiant de la fiche, écrit en gris clair en haut à gauche de chaque fiche.

Conventions suivies dans ce livre

Polynômes

Dans ce cahier de calcul, nous avons choisi de noter les polynômes avec la lettre « X ».

- Ainsi, au lieu de considérer, par exemple, la fonction

$$t \mapsto 5t^4 - 3t^3 + 25t^2 + 10t - 1,$$

on considérera le polynôme

$$5X^4 - 3X^3 + 25X^2 + 10X - 1.$$

- On notera généralement les polynômes P ou Q . Par exemple, on peut poser $P = 5X^2 - 3X - 2$.
- Les polynômes peuvent être évalués en un nombre, comme les fonctions. Ainsi, pour $t \in \mathbb{R}$, on peut considérer $P(t)$. En reprenant l'exemple précédent, on a

$$P(1) = 5 \times 1^2 - 3 \times 1 - 2 = 0.$$

On dit alors que 1 est une racine de P .

Définition des variables

Dans certains exercices, nous avons choisi, par souci de clarté et de concision, de ne pas préciser à quel ensemble appartiennent les variables.

- Par exemple, on pourra demander de simplifier l'expression

$$\frac{2-x}{x+3} - \frac{1-x}{5-x}$$

sans préciser qui est la variable x .

- Dans ce cas, il faudra toujours considérer que la variable x est implicitement définie et appartient au bon ensemble.
- Dans l'exemple précédent, il est sous-entendu que x est un nombre réel différent de -3 et 5 .

Bons calculs à vous !

Énoncés

Forme canonique

Quelques calculs généraux pour commencer

Calcul 1.1



Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $(2x + 3)^2$

d) $(-\sqrt{3}t - \sqrt{15})^2$

b) $(3y - 4)^2$

e) $\left(\frac{3}{2}z + 2\right)^2$

c) $(-u + \sqrt{7})^2$

f) $\left(\frac{2}{5}v - \frac{2}{3}\right)^2$

Calcul 1.2 — Quelques factorisations.



Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - 25$

d) $u^2 + 6u + 9$

b) $4t^2 - 9$

e) $9v^2 - 12v + 4$

c) $\frac{2}{9}y^2 - \frac{4}{5}$

f) $2z^2 + 10\sqrt{2}z + 25$..

Calcul 1.3 — Quelques équations.



Résoudre les équations suivantes.

On donnera dans chaque cas l'ensemble des solutions.

a) $x^2 = 0$

d) $(-\sqrt{3}y + \sqrt{6})^2 = 0$

b) $z^2 = 17$

e) $2u^2 - 10 = 0$

c) $(2t + 10)^2 = 0$

f) $-\frac{3}{4}v^2 + \frac{4}{15} = 0$

Changements de forme

Calcul 1.4 — De la forme canonique à la forme développée.



Développer et réduire :

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| a) $(X - 3)^2 + 7$ | <input type="text"/> | d) $\sqrt{3}(2X - 1)^2 - 2\sqrt{3}$... | <input type="text"/> |
| b) $2(X + 3)^2 - 5$ | <input type="text"/> | e) $\frac{3}{4}\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + 1$ | <input type="text"/> |
| c) $-(X + \sqrt{2})^2 + 6$ | <input type="text"/> | f) $\frac{5}{2}\left(-\frac{1}{3}X - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{2}{9}$.. | <input type="text"/> |

Calcul 1.5 — Formes canoniques (I).



Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X - \alpha)^2 + \beta$.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a) $X^2 + 2X + 2$ | <input type="text"/> |
| b) $X^2 + 4X - 1$ | <input type="text"/> |

Calcul 1.6 — Formes canoniques (II).



Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X - \alpha)^2 + \beta$.

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) $-X^2 + 4X - 5$ | <input type="text"/> | c) $-9X^2 + 36X + 4$ | <input type="text"/> |
| b) $4X^2 - 8X - 3$ | <input type="text"/> | d) $-2X^2 - 20X - 17$ | <input type="text"/> |

Calcul 1.7 — Formes canoniques (III).



Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X - \alpha)^2 + \beta$.

- | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| a) $X^2 + 3X + \frac{1}{4}$ | <input type="text"/> | d) $-\frac{9}{8}X^2 - \frac{1}{2}X - 4$.. | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{4}X^2 + X - 1$ | <input type="text"/> | e) $\frac{1}{2}X^2 + \frac{2}{3}X + \frac{3}{4}$.. | <input type="text"/> |
| c) $\frac{2}{9}X^2 + 8X + \frac{1}{7}$.. | <input type="text"/> | f) $-\frac{4}{5}X^2 - \frac{5}{6}X - \frac{6}{7}$.. | <input type="text"/> |

Calcul 1.8 — Formes canoniques à paramètre (I).



Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X - \alpha)^2 + \beta$.

a) $X^2 + 3X + \lambda$

b) $\frac{1}{4}X^2 + \lambda X - 2$

c) $\lambda X^2 + 8X + 5$

Calcul 1.9 — Formes canoniques à paramètre (II).



Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Mettre les polynômes suivants sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme $a(X - \alpha)^2 + \beta$.

a) $-3X^2 - \lambda X + 2$

c) $-\frac{4}{5}X^2 - \frac{5}{6}\lambda X$

b) $\frac{1}{2}X^2 + \frac{2\lambda}{3}X + \frac{3\lambda}{4}$

Des représentations graphiques

Calcul 1.10




Voici la courbe représentative d'un polynôme du second degré.

Quelle est sa forme canonique ?

- (a) $(X + 2)^2 - 1$
- (b) $(X - 2)^2 - 1$
- (c) $(X + 2)^2 + 1$
- (d) $(X - 2)^2 + 1$

.....



Calcul 1.11




Voici la courbe représentative d'un polynôme du second degré.

Quelle est sa forme canonique ?

- (a) $-2(X + 3)^2 - 4$
- (b) $-2(X - 3)^2 - 4$
- (c) $-2(X + 3)^2 + 4$
- (d) $-2(X - 3)^2 + 4$

.....



Calcul 1.12



On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 4x - 2$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Après avoir calculé sa forme canonique, déterminer quelle est sa représentation graphique.




figure 1




figure 2




figure 3

Quelle est sa représentation graphique ?

(a) figure 1

(b) figure 2

(c) figure 3

.....

Calcul 1.13



On considère la fonction g définie par $g(t) = -\frac{1}{2}t^2 + t - 1$ pour $t \in \mathbb{R}$.

Après avoir calculé sa forme canonique, déterminer quelle est sa représentation graphique.




figure 1




figure 2




figure 3




figure 4

Quelle est sa représentation graphique ?

(a) figure 1

(b) figure 2

(c) figure 3

(d) figure 4

.....

Calculs plus avancés

Calcul 1.14 — Forme canonique et inégalités.



Dans chacun des cas, déterminer si la proposition est « vraie » ou « fausse » à l'aide de la forme canonique d'un polynôme du second degré.

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 1 \geq \frac{1}{2}$

c) $\forall z \in \mathbb{R}, 3z + z^2 < 2z^2 - 4$..

b) $\forall t \in \mathbb{R}, t^2 + 3t > -1$

d) $\forall v \in \mathbb{R}, \frac{4}{49}v^2 + \frac{61}{9} \geq \frac{20}{21}v$..

Calcul 1.15 — Forme canonique et équations de cercles.



Dans chacun des cas, reconnaître le cercle défini par l'équation cartésienne donnée.

On donnera son centre Ω et son rayon r .

a) $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 1 = 0$

b) $x^2 + y^2 + 6x - 10y + 18 = 0$

c) $x^2 + y^2 - x - \frac{2}{3}y = \frac{23}{36}$

d) $x^2 + y^2 + \frac{5}{2}x + \frac{8}{3}y = -\frac{193}{144}$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{l}
 -2(X+5)^2 + 33 \quad -\frac{4}{5}\left(X + \frac{25}{48}\lambda\right)^2 + \frac{125}{576}\lambda^2 \quad \Omega = (1, -2) \text{ et } r = 2 \quad \text{vraie} \\
 \left(\frac{\sqrt{2}}{3}y - \frac{2}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{3}y + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \quad 9y^2 - 24y + 16 \quad (u+3)^2 \quad \frac{2}{9}(X+18)^2 - \frac{503}{7} \quad \{-5\} \\
 (2t-3)(2t+3) \quad \Omega = \left(-\frac{5}{4}, -\frac{4}{3}\right) \text{ et } r = \sqrt{2} \quad \{\sqrt{2}\} \quad u^2 - 2\sqrt{7}u + 7 \quad \text{vraie} \\
 X^2 - 6X + 16 \quad \Omega = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \text{ et } r = 1 \quad -\frac{4}{5}\left(X + \frac{25}{48}\right)^2 - \frac{2}{4} \frac{581}{032} \quad \left(X + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + \lambda \\
 \lambda\left(X + \frac{4}{\lambda}\right)^2 - \frac{16}{\lambda} + 5 \quad \frac{1}{2}\left(X + \frac{2\lambda}{3}\right)^2 - \frac{2\lambda^2}{9} + \frac{3\lambda}{4} \quad (X+1)^2 + 1 \quad -\frac{9}{8}\left(X + \frac{2}{9}\right)^2 - \frac{71}{18} \\
 \{0\} \quad -X^2 - 2\sqrt{2}X + 4 \quad \frac{1}{2}\left(X + \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{19}{36} \quad \frac{9}{4}z^2 + 6z + 4 \quad -3\left(X + \frac{\lambda}{6}\right)^2 + \frac{\lambda^2}{12} + 2 \\
 \frac{4}{25}v^2 - \frac{8}{15}v + \frac{4}{9} \quad 2X^2 + 12X + 13 \quad (X+2)^2 - 5 \quad \textcircled{c} \quad \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\} \quad \text{fausse} \\
 -9(X-2)^2 + 40 \quad 3t^2 + 6\sqrt{5}t + 15 \quad \textcircled{d} \quad \left\{-\frac{4\sqrt{5}}{15}, \frac{4\sqrt{5}}{15}\right\} \quad \frac{1}{4}(X+2)^2 - 2 \\
 (x-5)(x+5) \quad 4x^2 + 12x + 9 \quad (3v-2)^2 \quad 4(X-1)^2 - 7 \quad \textcircled{a} \quad \frac{5}{18}X^2 + \frac{10}{9}X + \frac{8}{9} \\
 \frac{3}{4}X^2 + \frac{3}{4}X + \frac{19}{16} \quad \Omega = (-3, 5) \text{ et } r = 4 \quad (\sqrt{2}z+5)^2 \quad \frac{1}{4}(X+2\lambda)^2 - \lambda^2 - 2 \\
 4\sqrt{3}X^2 - 4\sqrt{3}X - \sqrt{3} \quad \{-\sqrt{17}, \sqrt{17}\} \quad \textcircled{c} \quad \text{fausse} \quad -(X-2)^2 - 1 \quad \left(X + \frac{3}{2}\right)^2 - 2
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 154

Discriminant et racines I

Quelques calculs généraux pour commencer

Calcul 2.1



Calculer les nombres suivants.

On attend la forme la plus simple possible.

a) $\frac{10 - \sqrt{16}}{4}$

c) $\frac{-6 - \sqrt{12}}{2}$

b) $\frac{5 + \sqrt{9}}{6}$

d) $\frac{8 + \sqrt{48}}{4}$

Calcul 2.2



Calculer les nombres suivants.

On attend les résultats sous la forme d'une fraction irréductible.

a) $5^2 - 4 \times 5 \times \frac{3}{8}$

c) $-7^2 - 8 \times \frac{1}{3} \times 27$

b) $(-6)^2 + \frac{3}{5} \times (-7) \times 15$

d) $\left(-\frac{5}{4}\right)^2 - 5 \times \frac{17}{32} \times \frac{24}{15}$

Premiers calculs

Calcul 2.3 — Premiers discriminants.



Calculer le discriminant de chacun des polynômes définis ci-dessous.

a) $X^2 + 2X + 3$

b) $-X^2 - 2X + 4$

Calcul 2.4 — Calculs de discriminants.



Calculer le discriminant de chacun des polynômes définis ci-dessous.

a) $3X^2 - 4X + \frac{7}{4}$

c) $\frac{4}{5}X^2 - \sqrt{7}X - \frac{5}{6}$

b) $\frac{1}{2}X^2 + \frac{2}{3}X - \frac{3}{4}$

d) $\frac{\sqrt{6}}{7}X^2 + \sqrt{3}X + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Calcul 2.5 — Premières racines.



Déterminer les racines de chacun des polynômes suivants.

- a) $X^2 + 2X - 4$ b) $-X^2 - 3X + 2$

Calcul 2.6 — Calculs de racines.



Déterminer les racines de chacun des polynômes suivants.

- a) $4X^2 - 3X + \frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}X - 3$
- c) $2X^2 + \frac{1}{3}X - \frac{1}{3}$
- d) $3X^2 - 2\sqrt{2}X - \frac{2}{3}$

Calcul 2.7 — Un polynôme à paramètre.



Soit $b \in \mathbb{R}$. On considère le polynôme $P = X^2 + bX + 1$.

- a) Lorsque $b = -2$, le polynôme P admet-il deux racines distinctes?
- b) Calculer le discriminant de P en fonction de b
- c) Pour quelles valeurs de b le polynôme admet-il deux racines distinctes? ...

Calcul 2.8 — Un deuxième polynôme à paramètre.



Soit $a \in \mathbb{R}^*$, un réel non nul. On considère le polynôme $Q = aX^2 + 3X - 5$.

- a) Calculer le discriminant de Q
- b) Pour quelles valeurs de a le polynôme Q a-t-il exactement une racine? ...

Calcul 2.9 — Un troisième polynôme à paramètre.



Soit $c \in \mathbb{R}$. On considère le polynôme $R = 2X^2 - 5X + c$.

- a) Calculer le discriminant de R
- b) Pour quelles valeurs de c le polynôme R n'admet-il aucune racine?

Calcul 2.10 — Inéquations (I).

Résoudre les inéquations suivantes. On attend le résultat sous la forme d'un intervalle ou de la réunion de deux intervalles.

a) $2x^2 - 5x + 3 > 0$

b) $y^2 + 3y \leq 2$

c) $-t^2 < 5t + 4$

Calcul 2.11 — Inéquations (II).

Résoudre les inéquations suivantes. On attend le résultat sous la forme d'un intervalle ou de la réunion de deux intervalles.

a) $4z \geq \frac{3}{4} - z^2$

b) $\frac{1}{3}u^2 + \frac{2}{5}u + \frac{3}{7} > 0$

c) $v - \sqrt{3} \geq v^2$

Calculs plus avancés**Calcul 2.12 — Propositions paramétrées I.**

Soit $a \in \mathbb{R}$.

Pour quelle(s) valeur(s) de a la proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$ » est-elle vraie ?

a) Avec $P = aX^2 + 3X - 4$

b) Avec $P = \frac{2}{5}X^2 + 2aX + \frac{1}{3}$

c) Avec $P = \frac{3}{2}X^2 - \frac{5}{7}X + \frac{a}{2}$

Calcul 2.13 — Propositions paramétrées II.



Soit $a \in \mathbb{R}$.

Pour quelle(s) valeur(s) de a la proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$ » est-elle vraie ?

a) Avec $P = aX^2 + 3aX - 4$

b) Avec $P = \frac{2a}{5}X^2 + 2X + \frac{a}{3}$

c) Avec $P = \frac{3}{2}X^2 - \frac{7}{5}aX + \frac{a}{6}$

Calcul 2.14 — Un système à paramètre.



Soit $t \in \mathbb{R}$. On considère le système $\begin{cases} (x-5)^2 + (y-5)^2 = 5 \\ y = tx \end{cases}$ d'inconnues x et y .

Pour quelles valeurs de t le système précédent a-t-il des solutions ?

Réponses mélangées

$]-\infty, 1[\cup]\frac{3}{2}, +\infty[$ $\frac{13}{7}$ $\frac{35}{2}$ $-1 - \sqrt{5}$ et $-1 + \sqrt{5}$ $-\frac{43}{16}$ -5 non -27
 -3 et 2 -8 20 $a \in \left[-\sqrt{\frac{2}{15}}, \sqrt{\frac{2}{15}}\right]$ $25 - 8c$ $\frac{-3 - \sqrt{17}}{2}$ et $\frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$
 $a \in \left[\frac{25}{147}, +\infty\right[$ $a \in \left[0, \frac{25}{49}\right]$ $t \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ $\frac{29}{3}$ $-3 - \sqrt{3}$ $a \in \left[\sqrt{\frac{15}{2}}, +\infty\right[$ $2 + \sqrt{3}$
 $c \in \left[\frac{25}{8}, +\infty\right[$ $b^2 - 4$ $-\frac{9}{20}$ $\frac{\sqrt{2}-2}{3}$ et $\frac{\sqrt{2}+2}{3}$ $]-\infty, -2 - \frac{\sqrt{19}}{2}] \cup \left[-2 + \frac{\sqrt{19}}{2}, +\infty\right[$
 $b \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$ aucune $\frac{3 - \sqrt{5}}{8}$ et $\frac{3 + \sqrt{5}}{8}$ -121 $9 + 20a$ $\frac{3}{2}$ $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$
 \emptyset aucune $\left[\frac{-3 - \sqrt{17}}{2}, \frac{-3 + \sqrt{17}}{2}\right]$ $\frac{35}{18}$ $]-\infty, -4[\cup]-1, +\infty[$ \mathbb{R} $\frac{4}{3}$

► Réponses et corrigés page 159

Discriminant et racines II

Quelques calculs généraux pour commencer

Calcul 3.1



Donner, sous la forme d'un intervalle, l'ensemble des solutions des inéquations suivantes.

a) $-2x > \frac{4}{3}$

c) $2x - \frac{1}{12} < \frac{2}{3}x$

b) $2x - \frac{1}{5} \geq \frac{1}{3}$

d) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{5} \geq -\frac{1}{2}x + \frac{1}{6}$

Calcul 3.2



Simplifier les expressions suivantes, où n est un entier naturel.

a) $\frac{6^3 \times 2^{-5}}{4^2 \times 12^{-4}}$

c) $3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 3^{n-1}$...

b) $\frac{5^n \times 12^2}{10^n \times 6^4}$

d) $\frac{16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n}$

Factorisation de trinômes du second degré

Calcul 3.3



Factoriser les trinômes suivants.

On pourra commencer par déterminer les racines des polynômes en question.

a) $X^2 - 7X + 12$

b) $X^2 - 3X - 10$

c) $2X^2 - X - 3$

d) $6X^2 - 5X + 1$