

Les diagnostics infirmiers prévalents en uro-néphrologie

Respirer

- Échanges gazeux perturbés : hypercapnie, hypoxie.
- Mode de respiration inefficace (amplitude, fréquence).
- Dyspnée.

Boire et manger

- Risque de fausse route.
- Déficit nutritionnel ou excès nutritionnel.
- Perte de l'appétit.
- Déficit ou excès du volume liquidien.

Éliminer

- Constipation.
- Diarrhée.

Se mouvoir

- Mobilité réduite, altération de la mobilité physique.
- Diminution de l'irrigation tissulaire ou du débit cardiaque.
- Risque élevé à l'intolérance à l'effort.

Dormir et se reposer

- Habitudes de sommeil perturbées.

Se vêtir et se dévêtir

- Incapacité partielle ou totale de se vêtir et se dévêtir.

Maintenir sa température corporelle

- Hyperthermie, hypothermie : thermorégulation inefficace.
- Risques infectieux.

Être propre et protéger ses téguments

- Incapacité de se laver et d'effectuer ses autosoins.
- Atteinte à l'intégrité de la peau et des tissus.

Éviter les dangers, maintenir et promouvoir son intégrité physique et mentale

- Peur.
- Anxiété modérée ou extrême.
- Dénî.
- Douleur aiguë ou chronique.
- Non-observance.
- Incapacité à s'adapter à un changement de son état de santé.
- Perturbations de l'image de soi et de l'image corporelle.

Agir selon ses croyances

- Perte d'espoir.

S'occuper en vue de se réaliser

- Conflit décisionnel; incertitude quant à la ligne de conduite à adopter.

Apprendre

- Manque de connaissances.
- Prise en charge inefficace des facteurs de risque cardiologiques.