

1

DCI – PRINCEPS

Les génériques en un coup d'œil pour les infirmiers
© 2023, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

ABA – ABI

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ABACA VIR (comp. pelliculés sécables, à prendre pendant ou en dehors des repas/écrasement possible/existe en sol. buv.)	Ziagen®	(<i>Antirétroviral</i>) Traitement de l'infection par le VIH	Hypersensibilité à l'un des constituants Patients porteurs du gène <i>HLA-B*5701</i>	Troubles digestifs Rash Anorexie Fièvre Léthargie Céphalées, etc.
ABACA VIR + LAMIVUDINE (comp. pelliculés, à prendre pendant ou en dehors des repas)	Kivexa®	(<i>2 antirétroviraux</i>) Association de 2 antirétroviraux dans le traitement de l'infection par le VIH	Hypersensibilité à l'un des constituants Patients porteurs du gène <i>HLA-B*5701</i> Enfants < 25 kg	Troubles digestifs Éruptions cutanées Fièvre Léthargie Céphalées, etc
ABACA VIR + LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE (comp. pelliculés, à prendre pendant ou en dehors des repas)	Trizivir®	(<i>3 antirétroviraux</i>) Association de 3 antirétroviraux dans le traitement de l'infection par le VIH	IRT Patients porteurs du gène <i>HLA-B*5701</i> Hémoglobine < 7,5 g/dL Neutrophiles < 0,75 × 10 ⁹ /L, etc.	Troubles digestifs Éruptions cutanées Fièvre Léthargie Céphalées Rash, etc.
ABIRATÉRONÉ (comp. pelliculés/une prise quotidienne, 1 heure avant ou 2 heures après un repas, sans les écraser)	Zytiga®	(<i>Inhibiteur de la biosynthèse des androgènes</i>) Traitement du cancer métastatique de la prostate hormono- sensible ou résistant à la castration	Association d'abiratéroné et de prednisone/ prednisolone avec du radium Grossesse IHS	Cœdème périphérique Hypokaliémie Hypertension artérielle Infection du tractus urinaire Augmentation des ASAT/ ALAT Diarrhées, etc.

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACAMPROSATE (comp. pelliculés gastrorésistants, à prendre de préférence en dehors des repas si la tolérance digestive est bonne)	Aotal® Campral®	(<i>Dépendance alcoolique</i>) Maintien de l'abstinence chez le patient alcoolodépendant	Hypersensibilité à l'un des constituants IR Allaitement	Troubles digestifs Douleurs abdominales Flatulences Prurit Diminution de la libido, etc.
ACARBOSE (comp. sécables ou non/ peuvent être avalés ou croqués en début de repas)	Glucor®	(<i>Inhibiteur de l'alpha- glucosidase : diminution de l'hyperglycémie postprandiale</i>) Traitement du diabète de type 2 (DNID)	MICI Hernie intestinale majeure Ulcération du côlon IHS, IRS, etc.	Flatulences Douleurs gastrointestinales et abdominales Flatulences Diarrhées Peu fréquent : nausées, etc.
ACÉBUTOLOL (comp. pelliculés sécables ou non/la forme LP ne doit pas être écrasée/existe en sol. buv.)	Sectral® (... LP®)	(<i>Bêtabloquant sélectif</i>) HTA Traitement de certains troubles du rythme Prophylaxie des crises d'angor stable (forme LP) et d'effort	Hypotension Bradycardie Asthme sévère BPCO sévère IC non contrôlé Acidose métabolique Allaitement, etc.	Troubles digestifs Fatigue Dyspnées Céphalées Rash Anticorps antinucléaires, etc.
ACÉCLOFÉNAC (comp. pelliculés/à avaler entiers avec au moins un demi-verre d'eau/peut être pris pendant les repas)	Cartrex®	(AINS) Douleur et inflammation dans l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante	Hypersensibilité aux AINS Ulcère peptique évolutif ou ATCD ICS, IHS, IRS Grossesse \geq 6, etc.	Douleurs abdominales Nausées Diarrhées Élévation des enzymes hépatiques Dyspepsies Gastrites, etc.

ACÉ – ACÉ

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACÉNOCOUMAROL (comp. quadrisécables, à prendre 1 fois par jour, de préférence le soir, pour permettre la modulation de la dose en fonction de l'INR)	Mini-Sintrom® Sintrom®	(<i>Antithrombotique</i>) Traitement des TVP et de l'EP ainsi que la prévention de leur récurrence, en relais de l'héparine Cardiopathies emboligènes	IHS Hypertension sévère Association au millepertuis, au miconazole, à l'acide acétylsalicylique selon les doses Grossesse sauf exception	Manifestations hémorragiques : épistaxis, gingivorragie, hématomes, etc. Anémie secondaire à une hémorragie, etc.
ACÉTYLCYSTÉINE (comp. effervescents, pastilles à sucer, poudre et granulés pour sol. buv. en sachet-dose)	Fluimucil expectorant acétylcystéine® Exomuc® MucoDrill® Mucomyst®	(<i>Mucolytique</i>) Traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections bronchiques aiguës	Hypersensibilité à l'un des constituants Nourrissons (moins de 2 ans) Phénylcétonurie (si présence d'aspartame)	Risque de surencombrement bronchique Prurit, urticaire, etc. Possibles intolérances digestives
ACÉTYLCYSTÉINE (sol. inj. pour perf./le traitement doit être instauré dans les 8 h suivant le surdosage de paracétamol)	Hidonac®	(<i>Antidote du paracétamol</i>) Intoxication aiguë par le paracétamol, lorsque l'administration orale de NAC est impossible	Hypersensibilité à l'un des constituants	Fréquence indéterminée : nausées/vomissements, urticaire, prurit, hypotension, tachycardie, etc.
ACÉTYLLEUCINE (comp./existe en ampoule pour inj. IV)	Tanganil® TanganilPro®	(<i>Antivertigineux</i>) Traitement symptomatique de la crise vertigineuse	Hypersensibilité à l'un des constituants	Très rarement : éruptions cutanées, prurit, urticaire

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACICLOVIR (200 mg) (comp./existe en sol. inj. en IV stricte, à passer en 1 h. minimum, et en susp. buv.)	Zovirax®	(Antiviral) Prévention et traitement des infections à HSV	Hypersensibilité à l'un des constituants ou au valaciclovir	Céphalées Troubles digestifs Douleurs abdominales Sensations ébrieuses Prurit, etc.
ACICLOVIR (800 mg) (comp.)	Zovirax®	(Antiviral) Prévention des complications du zona oculaire de l'adulte en administration précoce	Hypersensibilité à l'un des constituants ou au valaciclovir	Céphalées Troubles digestifs Douleurs abdominales Sensations ébrieuses Prurit, etc.
ACICLOVIR (crème/5 applications par jour à débiter le plus tôt possible/ne pas dépasser 5 jours de traitement sans avis médical)	Activir® Herpesedermyl® Kendix® Remex® Zovirax®	(Antiviral) Traitement des poussées d'herpès labial localisé en application précoce	Hypersensibilité à l'un des constituants, au valaciclovir et au propylène glycol Enfants < 6 ans	Possibles : sensations de picotements, sécheresse cutanée, prurit, etc.
ACICLOVIR (pommade ophtalmique, à appliquer dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, 5 fois par jour)	Zovirax®	(Antiviral) Kératite herpétique	Hypersensibilité à l'un des constituants et au valaciclovir	Picotements ou brûlures temporaires Kératite ponctuée superficielle, etc.

ACI – ACI

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (comp. à croquer ou non, comp. effervescents, comp. gastro-résistants)	Alka-Seltzer® Aspirine® Aspro® AsproFlash®	(AINS) Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles	UGD en évolution IHS, IRS ICS non contrôlée Grossesse ≥ 6mois Risque hémorragique, etc.	Possibles : ulcère gastrique, hémorragies digestives, céphalées, vertiges syndrome de Reye chez l'enfant, etc.
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE (comp. gastro-résistants, à prendre entiers, sans les écraser/existe en poudre pour sol. buv.)	Aspirine Protect® Kardégic® Résitune®	(AINS/ <i>antithrombotique</i>) Prévention des complications vasculaires dans la maladie athéromateuse ischémique, etc.	ATCD d'asthme induit par le principe actif ou un autre AINS ATCD d'AVC hémorragique Thrombocytopénie, etc.	Possibles : ulcère gastrique, gastrite, douleurs abdominales, céphalées, vertiges, etc.
ACIDE ALENDRONIQUE (comp. à prendre à jeun, assis ou debout, avec un grand verre d'eau/ne pas écraser/ne pas s'allonger jusqu'à 30 min après)	Fosamax® Stéovess®	(<i>Anti-ostéoporotique</i>) Traitement de l'ostéoporose postménopausique/ réduit le risque de fracture vertébrale et de la hanche	Hypocalcémie Incapacité à se tenir debout ou assis pendant au moins 30 min Anomalie de l'œsophage retardant le transit : sténose, achalasie	Douleurs abdominales Douleurs ostéoarticulaires ou musculaires Asthénie Dyspepsie Nausées Céphalées, etc.

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACIDE ALENDRONIQUE + CHOLÉCALCIFÉROL (comp., à prendre à jeun, assis ou debout, avec un grand verre d'eau/ne pas écraser/ ne pas s'allonger jusqu'à 30 min après/existe en comp. effervescents)	Adroavance® Fosavance®	(<i>Anti-ostéoporotique + vitamine D3</i>) Traitement de l'ostéoporose postménopausique/ réduit le risque de fracture vertébrale et de la hanche	Hypocalcémie Incapacité à se tenir debout ou assis pendant au moins 30 min Anomalie de l'œsophage retardant le transit : sténose, achalasie	Douleurs ostéoarticulaires ou musculaires Douleurs abdominales Céphalées Vertiges Asthénie, etc.
ACIDE CARGLUMIQUE (comp. dispersibles, à laisser fondre dans un verre d'eau et à prendre extemporanément)	Carbaglu® Ucédane®	(<i>Analogue structural du N-acétylglutamate</i>) Hyperammoniémie	Hypersensibilité à l'un des constituants Allaitement	Hyperhidrose Peu fréquents : diarrhées, vomissements, bradycardie fièvre, etc.
ACIDE FOLIQUE (comp./5 mg/la posologie habituelle est de 1 à 3 comp. par jour)	Spécialfoldine®	(<i>Vitamine B9</i>) Carences en vitamine B9 (malnutrition, éthyilisme, malabsorption intestinale) Prévention primaire du risque d'AFTN	Hypersensibilité à l'un des constituants	Possibilité de troubles gastrointestinaux Très rares cas de réactions allergiques cutanées Possible urticaire ou angioœdème

ACI – ACI

DCI	PRINCEPS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	EFFETS INDÉSIRABLES
ACIDE FOLIQUE (comp. 0,4 mg, à prendre au moins 4 semaines avant la conception et dans les 8 semaines qui la suivent)	Spécialfoldine® Spinafol®	(Vitamine B9) Prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN)	Hypersensibilité à l'un des constituants	Possibilité de troubles gastrointestinaux Très rares cas de réactions allergiques cutanées Possible urticaire ou angioedème
ACIDE FUSIDIQUE (FUSIDATE DE SODIUM) (crème : convient aux lésions suintantes, macérées et des plis/existe en pommade pour les autres plaies)	Fucidine®	(Antibiotique) Infections de la peau dues à staphylocoque et streptocoque	Hypersensibilité à l'un des constituants	Peu fréquents : prurit, rash, douleurs et irritations au site d'application, etc.
ACIDE FUSIDIQUE (FUSIDATE DE SODIUM) (comp./existe en poudre pour sol. pour perf. IV et sol. buv. en flacon)	Fucidine®	(Antibiotique) Traitement des infections staphylococciques notamment cutanées, osseuses et articulaires	Hypersensibilité à l'un des constituants Traitement concomitant par statines	Troubles digestifs Dyspepsie Ictère Asthénie Peu fréquents : céphalées, somnolence, etc.
ACIDE FUSIDIQUE (gel ophtalmique/appliquer une goutte dans le sac conjonctival inférieur, matin et soir/attendre 15 min. avant instillation d'un autre collyre)	Fucithalmic®	(Antibiotique) Traitement antibactérien local des conjonctivites, des kératites, des ulcères cornéens, des orgelets et des blépharites	Hypersensibilité à l'un des constituants	Douleurs, prurit, irritation au niveau du site d'application Vision floue Angioedème, etc.